

Infektionsfahrten, Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen














































Stand 20.09.2017

Transporte mit geringer und leichter Infektionsgefährdung (Gefährdungsgruppen B + C)

Händedesinfektion: Softa-Man acute, Einwirkzeit 30 Sekunden (bei Influenza und Noroviren bzw. „Magen-Darm“ 60 Sekunden)

Gezielte Flächendesinfektion unmittelbar nach Kontamination mit potenziell infektiösem Material und/oder nach Transport von infizierten Patienten aller erreichbaren horizontalen Flächen und Kontaktflächen als Scheuer-Wisch-Desinfektion mit **Incidin® Rapid 0,75%**, Einwirkzeit 30 Minuten, nach Trocknung sofort einsatzfähig.

Sonderfall offene TB: Incidin Active: 1 %, Einwirkzeit 30 Minuten, nach Trocknung sofort einsatzfähig / **Sonderfall Clostridien:** Incidin® Rapid 2 %, Einwirkzeit 60 Minuten, nach Trocknung sofort einsatzfähig

Erreger	Übertragungsweg	Personalschutz
HIV / HBV / HCV (Viren)	Blut / Sekret	 nur wenn Blut / Sekret ausgeschieden wurde oder bei invasiven Maßnahmen:  
Salmonellen (Bakterien)	Stuhl Schmierinfektion	 nur wenn Stuhl ausgeschieden wurde:  
Clostridien (Sporenbildner)	Stuhl Schmierinfektion	 nur wenn Stuhl ausgeschieden wurde:   Incidin rapid: 2% und 60 Minuten 
offene TB (Bakterien)	Tröpfcheninfektion	    bei Intubation:   Patient hustet stark: Für Patient 
Meningokokken Meningitis (Bakterien) auch beim Verdacht		
Influenza (Viren)	Tröpfcheninfektion	    bei Intubation:   Patient hustet stark: Für Patient 
MRSA / ORSA / ESBL VRE / 4-MRGN (Bakterien)	Schmierinfektion Tröpfcheninfektion (nur bedingt)	    bei Intubation:   Patient hustet stark: Für Patient  
3-MRGN (Bakterien)	Schmierinfektion Tröpfcheninfektion (nur bedingt)	  bei Intubation:   
Noroviren (Viren) auch beim Verdacht „Magen-Darm-Infektion oder Brechdurchfall“	Schmierinfektion Tröpfcheninfektion	    bei Intubation:   Für Patient  

Der Norovirusverdacht und Influenzaverdacht ist zu Beginn des Transportes dem Krankenhaus mitzuteilen

Infektionsfahrten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen

Transporte mit schwerwiegender Infektionsgefährdung (Gefährdungsgruppe D)

Händedesinfektion: Softa-Man acute, Einwirkzeit 60 Sekunden, Wirkungsbereich B

Intensive Desinfektionsmaßnahmen: Schlussdesinfektion des gesamten Fahrzeugs, innen, als Scheuer-Wisch-Desinfektion mit Incidin® Active 3%, Einwirkzeit 60 Minuten








VHF / Pest / Milzbrand / Tollwut	Schmierinfektion / Tröpfcheninfektion	<p style="color: red; font-weight: bold;">Fahrzeug nach dem Transport in der Feuerwache gesichert abstellen. Hygienemaßnahmen und Desinfektionsmaßnahmen etc. mit dem Gesundheitsamt / Desinfektor absprechen.</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Personalschutz:</p>
		 <p style="color: red; font-weight: bold;">Evtl. weitere Maßnahmen nach Absprache.</p>

Krankentransporte mit einer Infektionsgefährdung für den Patienten (Gefährdungsgruppe E)

Händedesinfektion: Softa-Man acute, Einwirkzeit 30 Sekunden

Gezielte Flächendesinfektion unmittelbar nach Kontamination mit potenziell infektiösem Material und/oder nach Transport von infizierten Patienten aller erreichbaren horizontalen Flächen und Kontaktflächen als Scheuer-Wisch-Desinfektion mit Incidin® Rapid 0,75%, Einwirkzeit 30 Minuten

Polytrauma, Verbrennungen, Frühgeburt, Immunsuppression	Patienten- und Personalschutz	 <p style="text-align: center; font-weight: bold;">nach Möglichkeit vor Transport</p>
---	-------------------------------	---

Zeichenerklärung:	Telefonnummern:
 = Einweghandschuhe tragen	Gesundheitsamt Steinfurt: Zentrale: 02551 692820
 = Mund-Nasenschutz tragen	
 = FFP 2 Maske tragen	Desinfektor Wache:
 = flüssigkeitsdichten Einmalschutzkittel tragen	
 = gezielte Flächendesinfektion durchführen	
 = nach Händedesinfektion die Hände waschen	
 = Schutzbrille tragen	Gefährdungsgruppe: Siehe hierzu die Erklärung im Hygieneplan